

# Rassenlijstkaartje Maisrassen 2011

## Landbouwkundige eigenschappen

rassen 3 jaar of meer in onderzoek bij PPO en / of DLV

Maisras	Landbouwkundige eigenschappen						Zaaiaadvies			Geschiktheid grondsoort				
	Vroegheidsindex	Helminthosporium index <sup>3</sup>	Stevigheid	Stengelrot resistentie	Builenbrandresistentie	Snelheid grondbedekking	Zaaien voor 5 mei (korrels/ha x 1.000)	Zaaien na 5 mei (korrels/ha x 1.000)	Korrelmais, CCM, MKS (korrels/ha x 1.000)	goede vochtige koude grond	droogte gevoelige grond	slechte gevoelige grond		
<b>Zeer Vroeg</b>														
Aritzo	190	2	8,5	6	8,5	8	110	105	n.v.t.					
Atrium	200	1	7,5	7	8,5	9	105	100	n.v.t.					
Azelo	200	1	7	8	8	8	105	100	n.v.t.					
Coryphee	205	2	7,5	8,5	8	7,5	105	100	n.v.t.					
Chavoxx	210	3	8,5	7	8,5	7	105	100	90					
Expert	210	1	8	6	8,5	8,5	105	100	n.v.t.					
LG 30.211	210	3	8	7,5	8	8,5	105	100	n.v.t.					
LG 30.208	210	1	8	7	8,5	8,5	105	100	n.v.t.					
NK Baleric	210	3	7,5	7,5	8,5	8	105	100	n.v.t.					
<b>Vroeg</b>														
Aastar	215	1	8	8,5	9	7,5	100	95	n.v.t.					
Adenzo	215	1	8	7,5	9	7	105	100	n.v.t.					
Castro	215	1	7	8	8	7,5	100	95	n.v.t.					
Dualto	215	3	8,5	7,5	8	8	100	95	n.v.t.					
Nerissa	215	3	8,5	7	8,5	7	100	95	n.v.t.					
Nitro	215	3	8	7,5	8	8	100	95	n.v.t.					
NK Falkone	215	3	7	8	8	8	100	95	90					
NK Jasmic	215	3	7	8	6,5	8,5	100	95	n.v.t.					
NKBull	215	3	7,5	8	8,5	8,5	100	95	n.v.t.					
Podium	215	2	8,5	8,5	8	7,5	100	95	90					
PR39N39	215	3	7,5	8	8,5	8	100	95	n.v.t.					
Salgado	215	3	8,5	8,5	8,5	7,5	100	95	n.v.t.					
Aabsint	220	1	8	7,5	8,5	8,5	100	95	n.v.t.					
Bravour	220	3	6,5	7,5	9	7,5	95	100	n.v.t.					
LG 30.218	220	3	8	7	8,5	8	95	90	n.v.t.					
Logo	220	3	9	6,5	8,5	8	100	95	90					
Maismix <sup>2</sup>	220	3	7	8	8,5	8,5	100	95	n.v.t.					
MAS17E	220	3	7	8,5	9	8	100	95	n.v.t.					
Saludo	220	3	6,5	7	9	8	95	100	n.v.t.					
Starchy	220	3	8,5	7	8,5	6	100	95	n.v.t.					
Tiago	220	3	8	7	7	8	100	95	n.v.t.					
Abriko	225	1	8	7,5	8,5	8	100	95	n.v.t.					
AmBall	225	3	7,5	8,5	8	8	100	95	85					
Amadeo	225	2	8	9	8	7,5	100	95	85					
Ayro	225	3	6	8,5	8,5	8,5	95	100	n.v.t.					
ES Fortran	225	3	8	8	8,5	7	100	95	n.v.t.					
LG 30.221	225	3	8	8,5	8	9	95	100	n.v.t.					
<b>Middenvroeg</b>														
LG 30.225	230	3	7,5	8,5	8	9	95	90	n.v.t.					
LG 32.27	230	2	6	8	8,5	7,5	95	90	n.v.t.					
LG 32.34	230	3	8,5	8	8,5	8	100	95	n.v.t.					
NK Cooler	230	4	7	8	8,5	8,5	95	90	n.v.t.					
NK Nektar <sup>4</sup>	230	3	7	8	8	8	95	90	85					
Ricardinio	230	1	8	7	8,5	8	95	90	85					
Impresario	235	3	7	7	8	8	95	90	n.v.t.					
Jogger	235	3	7	8	8	8	95	90	n.v.t.					
NK Famous	235	3	7	8,5	8	8,5	95	90	n.v.t.					
NK Sigmund	235	3	7	9	8	8,5	95	90	n.v.t.					
NK Top	235	3	7	8	8	8,5	95	90	85					
Torres	235	3	7	8	8	8	95	90	n.v.t.					
Nutreca <sup>1</sup>	240	3	7	8,5	8,5	8,5	95	90	n.v.t.					
PR39T45	240	4	8,5	8,5	8	8	95	90	n.v.t.					
Ronaldinio	240	3	7	7,5	8,5	8,5	95	90	85					
Fadeo	250	3	7,5	8,5	8	7,5	90	n.v.t.	80					
PR39F58	250	4	7,5	8	8	7,5	90	n.v.t.	n.v.t.					
<b>Rassen in onderzoek</b>														
SY Multitop	235	-	7	7	8,5	8	95	90	n.v.t.					
Millesim	240	-	7,5	8	7,5	8	95	90	n.v.t.					

Bron: gegevens PPO, DLV Plant, Maiswekers en waarnemingen GroeiPartners (gemiddelde 2007 t/m 2010)

<sup>1</sup>= Nutreca 3 jaar in onderzoek PPO, MAS17E 2 jaar in onderzoek DLV

<sup>2</sup>= Gegevens Maismix zijn berekend. Maismix bestaat uit de rassen Nitro, Ayro en Messago

<sup>4</sup>= Gegevens onderzoek t/m 2009

**Helminthosporium index<sup>3</sup>**

1= Rassen zijn vroeg gevoelig bij gewone infectiedruk, 2= Rassen zijn gevoelig bij sterke infectiedruk,

3= Rassen worden langzaam gevoelig bij sterke infectiedruk, 4= Rassen zijn bijna ongevoelig (tolerant), vaak late rassen

Ondanks alle betrouwbare zorgvuldigheid waarmee de cijfers van de verschillende bronnen tot stand zijn gekomen, is GroeiPartners niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, verband houdende met eventuele onjuistheden in de verschillende tabellen